

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 5 комбинированного вида»


Согласовано

Председатель ППО

 Т.Г.Рыбакова

Протокол № 4

« 05 » июня 2016г.



Инструкция № 1

по оказанию первой доврачебной помощи при отравлении ядовитыми растениями

Общее положение

К ядовитым растениям относят:

- 1) вех ядовитый
- 2) клещевина обыкновенная – отравление происходит семенами, похожими на фасоль, бобы; употребление 2-3 семян-отравление, 10 семян приводит к смерти
- 3) белена черная
- 4) дурман обыкновенный – ядовиты все части растения
- 5) паслен черный
- 6) ландыш майский- плоды
- 7) бузина черная
- 8) молочай
- 9) волчья ягода
- 10) амброзия

Краткая характеристика ядовитых растений

Вех ядовитый - похож на огородные растения - петрушку, укроп. Произрастает на влажных местах, вдоль рек и озер, в кустарниках. Все части растения ядовиты.

Отличительным свойством этого растения является приятный запах, который выделяется при растирании. Людей его части, наличие толстого корневища, разделенного поперечными перегородками на камеры.

Клещевина - отравление наступает, если съесть семена растения, похожие на бобы и фасоли. Плоды (семена) размещаются в трехгнездных коробочках, привлекают яркой окраской. Тяжелые отравления возможны от 2-3 семян.

Белена черная - произрастает на пустырях, вдоль дорог, на заброшенных полях. Все растение покрыто мягкими, клейкими волосками, издает специфический неприятный запах. Отравление чаще всего наступает от семян, которые дети принимают за мак.

Дурман обыкновенный - растение пустырей. Отравление наступает от съеденных семян и вдыхания запаха цветущего растения. Цветение с середины июня по сентябрь. Плод - коробочка шаровидной формы, покрыта шипами. Созревшая коробочка открывается четырьмя створками, внутри которой находятся почковидные черные семена.

Паслен - отравление наступает от съеденных плодов растения, имеющих форму шаровидных ягод черного цвета, сладковато-горького вкуса.

Ландыш майский - имеет плод - ярко-красную ягоду. Отравление вызывает съеденные ягоды.

Бузина черная - цветки белые, собраны в щитковидные соцветия, плоды черно-фиолетового цвета, ягоды, мякоть плода темно-красная с морщинистыми косточками. Отравление вызывает съеденные ягоды.

Молочай лозный - ядовитым является млечный сок, содержащийся в стебле растения. При попадании на кожу или слизистые рта, глаз, носа возникает острый воспалительный процесс.

В зависимости от появления первых клинических симптомов отравления делится на две группы: отравления со скрытым периодом от 0,5 до 2 часов и отравления со скрытым периодом от 8 до 24 часов.

Симптомы

К первой группе относятся отравления, протекающие по типу гастроэнтерита - внезапная тошнота, рвота, профузный понос. Быстро развивается обезвоживание организма, снижается температура тела, спазм кишечника, резкий пульс, сужение зрачков, в тяжелых случаях - резкое падение АД, нарушение дыхания, отек легкого.

Отравление со скрытым периодом - внезапная повторяющаяся рвота, боли в животе, понос. Стул может иметь вид «рисового отвара». На этом фоне возможно развитие коллапса, т. к. ребенок теряет много жидкости, солей калия, натрия и хлоридов. Если больной выходит из этой стадии отравления, возникает картина тяжелого поражения печени, почек, спутанность сознания, возбуждение, судороги.

Вех ядовитый - наступают очень быстро. Первые признаки отравления: боли в животе, головная боль, головокружение, слабость, тошнота, рвота, бледность, затрудненное дыхание. В последующем присоединяются судороги и потеря сознания.

Клещевина - признаки отравления наступают через 1-2 часа: головная боль, покраснение зева, боли в глотке, понижение температуры ниже нормы, пульс частый и малый.

Белена черная - сухость слизистой полости рта и кожи, кожная сыпь, осиплость голоса, гиперемия слизистых зева, жажда, тошнота и рвота, может повышаться температура тела, отсутствие реакции зрачков на свет.

Дурман обыкновенный - сухость слизистой полости рта и кожи, кожная сыпь, осиплость голоса, гиперемия слизистых зева, жажда, тошнота и рвота, может повышаться температура тела, отсутствие реакции зрачков на свет.

Паслен сладко-горький - сухость слизистой полости рта и кожи, кожная сыпь, осиплость голоса, гиперемия слизистых зева, жажда, тошнота и рвота, может повышаться температура тела, отсутствие реакции зрачков на свет.

Ландыш майский - головная боль, шум в ушах, головокружение, холодный пот, тошнота, понос, редкий аритмичный пульс. Зрачки сужены, возможны судороги.

Бузина черная - отравление вызывают съеденные ягоды. Возникает рвота, понос.

Молочай лозный — на месте поражения появляется покраснение, пузыри. Если ребенок пробовал есть растение, возникает рвота, понос, в тяжелых случаях - судороги, нарушение дыхания, сердечной деятельности.

В зависимости от появления первых клинических симптомов отравления делится на две группы: отравления со скрытым периодом от 0,5 до 2 часов и отравления со скрытым периодом от 8 до 24 часов.

Оказание первой доврачебной помощи

1. Белена черная – промывание желудка раствором гидрокарбоната натрия с активированным углем; влажное обертывание, холод на голову и паховые области.
2. Дурман обыкновенный - промывание желудка раствором гидрокарбоната натрия с активированным углем; влажное обертывание, холод на голову, паховые области.
3. Клещевина обыкновенная – искусственная рвота, многократное промывание желудка, клизмы с введением активированного угля, частые приемы слизистых отваров (кисель, желе); полный покой с обогреванием тела.
4. Паслен черный – промывание желудка активированным углем, искусственная вентиляция легких.

Требования по окончании работы

1. Поставить в известность медработника, руководителя учреждения.

2. Госпитализация в лечебное учреждение.

Оказание первой доврачебной помощи

Обильное питье с последующим вызыванием рвоты, очистительная клизма. Промывание желудка взвесью активированного угля. Срочная госпитализация.

Требования по соблюдению мер безопасности

Для озеленения участка нельзя использовать ядовитые растения, деревья и кустарники с ядовитыми плодами.

Ознакомить детей с ядовитыми растениями и грибами.

Инструкция составлена на основе справочника Е. И. Чазова, О. М. Елисеева «Справочник по оказанию скорой и неотложной помощи».

Инструкцию составила Антонова Л.В., заведующая